



LABORATORIOS FELIPE BAJER

Más de 60 años al servicio de la salud

FARM-X POLVO

USO EXTERNO

Industria argentina - Venta bajo receta

50g

FÓRMULA CADA 100 g: Óxido de zinc 20 g; Undecilenato de zinc 10 g; Propionato de sodio 3 g; Ácido salicílico 0.60 g. Excipientes en c.s.: Alcoderm, Metilparabeno, Propilparabeno, Tierra de Batán.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Cicatrizante, epitelizador, antiinflamatorio, antimicrobiano, antimicótico.

INDICACIONES: Heridas accidentales y post-quirúrgicas. Quemaduras. Excoriaciones débiles. Escaras por decúbito. Úlceras por decúbito. Úlceras varicosas. Dermatitis por contacto. Dermatitis del pañal. Eritema del pañal. Prurito. Dermatofitosis. Dermatomicosis. Balanopostitis. Intertrigos de los pliegues en lactantes, niños y adultos.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Farm-X Polvo proporciona una acción astringente que disminuye el prurito y el ardor a través de un efecto secante y refrescante. Es fungicida. Actúa como antiséptico creando un medio desfavorable para el crecimiento bacteriano. Estimula la regeneración de la capa córnea y contribuye a normalizar la queratinización defectuosa.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Farm-X Polvo es un producto medicinal para uso externo exclusivamente.

En quemaduras y heridas profundas, el médico indicará la modalidad y frecuencia de uso, de acuerdo con la magnitud de la lesión.

En heridas superficiales, micosis, úlceras por decúbito y en excoriaciones leves, aplicar 2 o 3 veces por día espolvoreando la zona afectada, que deberá ser previamente higienizada y secada.

En dermatitis y eritema del pañal, espolvorear sobre la piel limpia y seca después de cada cambio de pañal, especialmente en la noche, cuando los cambios pueden ser menos frecuentes.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

ADVERTENCIAS: Farm-X Polvo es para uso externo exclusivamente. Evitar el contacto del producto con los ojos. Antes de su aplicación, deben lavarse y secarse bien las zonas de la piel a tratar, así como también las zonas circundantes a ellas.

PRECAUCIONES: Si la curación quedara adherida a vendajes o apósitos, éstos deben retirarse cuidadosamente, humedeciéndolos con agua tibia previamente hervida, con el fin de que se desprendan fácilmente sin arrastrar tejidos.

Embarazo/lactancia: no se han descripto problemas en humanos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: El uso concomitante del producto con preparados tópicos que poseen en su fórmula tretinoína, resorcinol, peróxido de benzoilo y/o alcohol; pueden causar irritación localizada.

EFFECTOS ADVERSOS: Ocasionalmente puede causar sequedad en la piel.

SOBREDOSIFICACIÓN: Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingesta accidental, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Unidad Toxicológica del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, tel.:(011) 4962-6666/ 2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Tel.: (011) 4469-9300, 4658-7777.

MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Conservar dentro de su envase original, cerrado, junto con su estuche y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado Nº 28915.

Dirección técnica: Farm. Lorena B. Ceraso.

Elaborado en: Alfredo R. Bufano 1265, Ciudad de Buenos Aires.