



Uso Externo

Industria Argentina

Fórmula cada 100 g: Óxido de zinc 20 g; Undecilenato de zinc 10 g; Propionato de sodio 3 g; Ácido salicílico 0.60 g. Excipientes en c.s.: Metilparabeno, Propilparabeno, Tierra de Batán.

Acción Terapéutica: Cicatrizante, epitelizador, antiinflamatorio, antimicrobiano, antimicótico.

Indicaciones:

- Heridas accidentales y post-quirúrgicas.
- Quemaduras.
- Excoriaciones débiles.
- Escaras por decúbito.
- Úlceras por decúbito.
- Úlceras varicosas.
- Dermatitis por contacto.
- Dermatitis del pañal.
- Eritema del pañal.
- Prurito.
- Dermatofitosis.
- Dermatomicosis.
- Balanopostitis.
- Intertrigos de los pliegues en lactantes, niños y adultos.

Acción Farmacológica: Farm-X Polvo proporciona una acción astringente que disminuye el prurito y el ardor a través de un efecto secante y refrescante. Es fungicida. Actúa como antiséptico creando un medio desfavorable para el crecimiento bacteriano. Estimula la regeneración de la capa córnea y contribuye a normalizar la queratinización defectuosa.

Óxido de zinc 20%
Undecilenato de zinc 10%
Propionato de sodio 3%
Ácido salicílico 0.6%
polvo 50 g

Posología Y Forma De Administración: Farm-X Polvo es un producto medicinal para uso externo exclusivamente.

En quemaduras y heridas profundas, el médico indicará la modalidad y frecuencia de uso, de acuerdo con la magnitud de la lesión. En heridas superficiales, micosis, úlceras por decúbito y en excoriaciones leves, aplicar 2 o 3 veces por día espolvoreando la zona afectada, que deberá ser previamente higienizada y secada. En dermatitis y eritema del pañal, espolvorear sobre la piel limpia y seca después de cada cambio de pañal, especialmente en la noche, cuando los cambios pueden ser menos frecuentes.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

Advertencias: Farm-X Polvo es para uso externo exclusivamente. Evitar el contacto del producto con los ojos. Antes de su aplicación, deben lavarse y secarse bien las zonas de la piel a tratar, así como también las zonas circundantes a ellas.

Precauciones: Si la curación quedara adherida a vendajes o apósitos, éstos deben retirarse cuidadosamente, humedeciéndolos con agua tibia previamente hervida, con el fin de que se desprendan fácilmente sin arrastrar tejidos. Embarazo/lactancia: no se han descrito problemas en humanos.

Interacciones Medicamentosas: El uso concomitante del producto con preparados tópicos que poseen en su fórmula tretinoína, resorcinol, peróxido de benzoilo y/o alcohol; pueden causar irritación localizada.

Efectos Adversos: Ocasionalmente puede causar sequedad en la piel.

Sobredosificación: Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingesta accidental, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Unidad Toxicológica del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, tel.: (011) 4962-6666/ 2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Tel.: (011) 4469-9300, 4658-7777.

Modo De Conservación Y Almacenamiento:

Conservar dentro de su envase original, cerrado, junto con su estuche y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C.

! MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Certificado N° 28915.

Dirección técnica: Farm. Lorena B. Ceraso.

Elaborado en: Alfredo R. Bufano 1265, Ciudad de Buenos Aires.



Óxido de zinc 20%
Undecilenato de zinc 10%
Propionato de sodio 3%
Ácido salicílico 0.6%

Uso Externo
polvo 50 g



LABORATORIOS FELIPE BAJER
Más de 60 años al servicio de la salud

www.bajerlaboratorios.com.ar