



● Vía tópica

Uso Externo Exclusivamente

Industria Argentina

- Lea todo el prospecto detenidamente antes del uso de este medicamento.
- Conserve este prospecto ya que puede leerlo nuevamente
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico de inmediato.

! MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿Qué contiene Farm-X® crema?

Ingredientes activos: Óxido de zinc 5.00 gramos; Undecilenato de zinc 2.5 gramos; Ácido salicílico 0.50 gramos; Propionato de sodio 0.85 gramos; cada 100 de crema.

Ingredientes inactivos: Cera lanette, Alcohol etílico 96°, Alcohol cetílico, Metilparabeno, Propilparabeno, Agua purificada.

¿Qué es Farm-X® crema?

Es una crema reparadora y cicatrizante de la piel.

¿Para qué se utiliza Farm-X® crema?

Se utiliza para el alivio local de: Raspaduras. Quemaduras leves. Paspaduras. Heridas leves, superficiales, no infectadas.

¿Qué personas no pueden usar Farm-X® crema?

No use este medicamento si usted sabe que es

Óxido de zinc
Undecilenato de zinc
Ácido salicílico
Propionato de sodio
crema 50 g

alérgico a alguno de los ingredientes, o se está aplicando otro medicamento simultáneamente.

¿Qué cuidados debo tener antes de usar Farm-X® crema?

Si usted tiene problemas de alergia en la piel, consulte a su médico y/o farmacéutico antes de usarlo.

Si usted está tomando algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Evitar el contacto con los ojos y otras mucosas (oral – genital). No utilizar vendajes oclusivos. No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona afectada. No aplicar simultáneamente con otros productos.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy aplicándome Farm-X® crema?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como sequedad de la piel. Se pueden producir reacciones alérgicas locales o generales tales como: erupción, prurito o hinchazón de la piel.

Si observa éstas o cualquier otra reacción no detallada en este prospecto, consulte con su médico y/o farmacéutico.

Si la zona afectada persiste por más de 5 días o empeora consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿Cómo se usa Farm-X® crema?

Aplicar una capa delgada de crema sobre la piel limpia y seca, 2 a 3 veces diarias. No utilizar con

mayor frecuencia a la indicada.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
- Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna) (011) 4300-2115
- Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777
- Hospital Fernández (011) 4808-2655/4801-7767
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555
- Optativamente otros centros de intoxicaciones

¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

Forma de conservación de Farm-X® crema

Conservar dentro de su envase original, cerrado, junto con su prospecto y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C.

Presentaciones

Envases conteniendo 10,20,25,50,100,120 gramos.

Elaborado y Fraccionado en: Cnel. Méndez 438/440, Wilde, Pdo. Avellaneda, Pcia. Bs. As.
Acondicionamiento secundario: Laboratorios Felipe Bajer S.A.I.C. Alfredo R. Bufano 1265. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Directora Técnica: Dra. Ceraso, Lorena Beatriz. MN 16.878

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 23.785



Vía tópica

Óxido de zinc
Undecilenato de zinc
Ácido salicílico
Propionato de sodio
crema 50 g



LABORATORIOS FELIPE BAJER
Más de 60 años al servicio de la salud

www.bajerlaboratorios.com.ar